

SAIGNEMENT

Appliquez un pansement compressif. Ajoutez une couche supplémentaire si le sang passe à travers. Utilisez une serviette ou un bout de tissu au besoin pour effectuer un garrot en dernier recours. Lorsque le pansement ne suffit pas, appliquez une compresse et continuez à appuyer fermement. Rendez-vous immédiatement à une clinique vétérinaire.

Ordre des pansements :

1. Pansement non adhésif
2. Bandage de coton, suivi d'une ouate hydrophile
3. Autre bandage de coton
4. Sparadrap chirurgical (adhère aux poils)
5. Couvrir le tout d'un pansement ou ruban adhésif (adhère aux poils)

IMPORTANT

- **N'incluez pas le pied lorsque vous bandez une patte.**
- **Ne laissez pas les pansements en place pendant plus de 24 heures.**

FRACTURE

Traitez les saignements. N'appliquez pas d'attelle. Confinez le chien pour le transport. Une boîte peut faire l'affaire avec les petits chiens.

BRÛLURE ET ÉCHAUDURE

Faites couler de l'eau froide sur la plaie pendant au moins 5 minutes. Contactez un médecin vétérinaire. Gardez le chien au chaud. N'appliquez aucune substance. S'il vous est impossible de vous rendre immédiatement à une clinique vétérinaire, appliquez un pansement imbibé d'une solution saline.

EMPOISONNEMENT

Appelez immédiatement un médecin vétérinaire. Produit : lire le contenu/les ingrédients sur l'emballage. Plante : l'identifier ou la décrire.

BALLE COINCÉE DANS LA GORGE

S'il vous est impossible de vous rendre rapidement à une clinique vétérinaire, essayez de pousser sur la gorge ou le cou de l'extérieur. Lorsque la langue ou les gencives sont bleues ou que le chien s'effondre : une personne ouvre la gueule; l'autre essaie de déloger la balle. Sinon, couchez le chien sur le côté : une personne appuie abruptement sur l'abdomen et soudainement derrière la dernière côte; l'autre s'empare de la balle une fois que celle-ci est visible.

PELAGE CONTAMINÉ

Empêchez votre animal de se lécher. Mettez-lui un collier élisabéthain. Si possible, rasez les poils touchés. N'utilisez jamais de térébenthine ni de décapant. Lorsque de grandes zones sont touchées, consultez un médecin vétérinaire.

COUP DE CHALEUR

Votre chien semble en détresse et halète fortement? Amenez-le dans un endroit frais, idéalement où il y a un courant d'air. Mouillez son pelage avec de l'eau tiède (pas froide). Appelez un médecin vétérinaire. Offrez-lui une petite quantité d'eau.

CRISE ÉPILEPTIQUE

Pendant la crise, évitez de tenir et de reconforter le chien. Assombrissez la pièce. Réduisez le bruit. Écartez ou coussinez les objets qui se trouvent à proximité. Appelez un médecin vétérinaire.

BAGARRE

Si le chien est en détresse, commotionné ou fatigué, appelez un médecin vétérinaire. En cas de douleur intense ou de plaie punctiforme sur la tête ou le corps, consultez immédiatement un médecin vétérinaire.

BLESSURE À UN ŒIL

Appelez un médecin vétérinaire. Saillant : appliquez un pansement humide et empêchez l'animal de frotter et de gratter. Produits chimiques : rincez l'œil plusieurs fois avec de l'eau, si possible à l'aide d'un flacon de gouttes ophtalmiques.

NOYADE

Essuyez le museau. Faites sortir l'eau en le tenant à l'envers par les pattes arrière. Faites des manœuvres de réanimation s'il ne respire plus. Consultez un médecin vétérinaire après l'incident.

CHOC ÉLECTRIQUE

Haute tension : restez à l'écart et appelez la police. À la maison : coupez l'alimentation. Si c'est impossible, utilisez un objet non métallique sec, comme un manche de balai, pour écarter le chien de la source d'alimentation. Faites des manœuvres de réanimation s'il ne respire plus. Appelez immédiatement un médecin vétérinaire.

PIQÛRE

Retirez le dard sans pincer la poche à venin. Lavez la zone avec de l'eau ou une solution de bicarbonate de soude. Appliquez de la glace. Appelez un médecin vétérinaire si le chien a été piqué dans la bouche ou la gorge.

ABDOMEN GONFLÉ

Un gonflement soudain est toujours grave. Appelez votre médecin vétérinaire sans tarder.